


**이동경로:**

우리 나라의 중부, 남부의 동, 서해안지대와 남해안지대에서 겨울을 난다.

서북부, 동부의 해안지대를 따라 봄, 가을에 지나간다.

세계적으로 동아시아일대에서 여름을 나며 동남아시아일대에서 겨울을 난다.

**분포:**

우리 나라의 중부, 남부의 동, 서해안지대와 남해안지대, 세계적으로 로씨야의 일부 지역, 중국, 만마, 방글라데슈, 타이의 일부 지역, 일본



- 서식지류실 (도로 및 도시건설, 농경지개간, 파도한 채취 및 리용, 생활오수 및 농약)



- 물오염 (세척제, 가정오물, 오수, 농약, 화학비료)



- 비법적인 사냥 (사냥총, 낚시줄 등)



이 책은 도이 헐란드 한스-자이델재단의 후원으로 출판되었다.

This publication was printed with support of Hanns Seidel Foundation (Germany).

T - 773389

# 흰죽지흰눈오리

*Aythya baeri*  
Baer's Pochard



조선 평양



**수컷**의 대가리와 목웃부분은 어두운 풀색이며 목아래부분은 검은 밤색빛 웃가슴은 붉은 밤색, 어깨는 검은 밤색, 홍채는 흰색

**암컷**의 대가리는 어두운 풀색이며 얼굴앞쪽과 배깃의 일부분은 밤색, 웃가슴은 검은 밤색, 몸털색과 홍채는 어두운 밤색



**형태:** 몸길이는 46~47Cm, 날개를 펼친 너비는 70~79Cm, 몸질량은 680~880g, 부리길이는 4.2~4.9Cm, 꼬리길이는 6.0~6.3Cm, 다리 길이는 3.5~3.7Cm

## 가을에 우리 나라에 와서 겨울을 나는 겨울철새(세계적인 전멸위기종:CR) 》

흰죽지흰눈오리는 검은댕기흰죽지오리와 류사하다.

암컷들은 비슷하나 수컷들은 구별하기가 쉽다.

그림은 암컷들의 차이점을 보여준다.

- 흥채의 색
- 정수리의 장식깃
- 꼬리밀부위색



**서식지:** 호수, 하천, 농, 늪, 습지, 해안선

근처에 있는 민물이나 강뚝

**기본먹이:** 물풀류의 종자와 뿌리, 물속벌레

**울음소리:** 수컷은 《코릇 코릇 코릇》하고 암컷은 《쿠릿 쿠릿 쿠릿》하는 3음절소리로 운다.