영명: *Bar-tailed Godwit* 학명: *Limosa lapponica*

큰뒷부리 도요



세계자연보전연맹 (IUCN)상태: "NT" (준위협)

NT

물새의 종류: 도요물떼새류

특징

번식하는 개체

번식하는 개체의 깃털은 전체적으로 황갈색을 띠며, 깃털윗부분에 얼룩무늬가 있음

사진 출처 © SeocheonCounty

© Chris Purnell

분포도

이동거리: >11,000km



큰뒷부리도요에 대해 더 알아보기

서식지:
북극의 계곡, 호수, 늪지대 근처의 툰드라 저지대에 있는 습지에서 번식하며, 겨울에는 갯벌이나 모래로 뒤덮인 갯벌 습지에서 서식

동아시아-**대양주 철새이동경로 내 개체수:**
(3종류의 아종(subspecies): *L. l. baueri, L. l. anadyrensis, L. l. menzbieri*) **약 272,000마리**

주요 위협요소:
서식지 감소와 파괴로, 특히 주요 경유지인 황해 내 서식지 감소 및 파괴이며 사냥으로도 고통받고 있음

큰뒷부리도요

EAAFP 큰뒷부리도요 워킹그룹 보전활동
https://www.eaaflyway.net/shorebird-working-group/

동아시아-대양주 철새이동경로 파트너십은 이동경로 내 파트너들로 구성되어 있으며, 이동성 물새와 그 서식지, 그리고 이에 의존하는 사람들의 생계를 보호하기 위해 설립되었습니다.
EAAFP 홈페이지 | www.eaaflyway.net

Contact us | secretariat@eaaflyway.net Follow us @ eaafp

Text and graphics © EAAFP 2021. All rights reserved by EAAFP Secretariat.
Illustration © MEET GREEN 2021. All rights reserved by MEET GREEN

후원자:

삽화: MEET GREEN